

# ANALISIS KADAR GLUKOSA DARAH PADA MAHASISWA OBESITAS SEBELUM DAN SESUDAH MENGONSUMSI PROBIOTIK DI POLTEKKES KEMENKES BENGKULU

*by Tedy Febriyanto*

---

**Submission date:** 07-Mar-2023 03:32PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2031069217

**File name:** artikel\_jurnal\_probiotik\_tedy.pdf (336.42K)

**Word count:** 2150

**Character count:** 13346

12

**ANALISIS KADAR GLUKOSA DARAH PADA MAHASISWA OBESITAS SEBELUM DAN SESUDAH MENGONSUMSI PROBIOTIK DI POLTEKKES KEMENKES BENGKULU**

Oleh :

**Tedy Febriyanto<sup>1</sup>, Sunita RS<sup>2</sup>, dan Cheilvi Fortuna Rizky<sup>3</sup>**

1,2,3 Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu

Email : tedyfebriyanto@gmail.com

**ABSTRAK**

8

Probiotik merupakan bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan yang mempunyai pengaruh menguntungkan pada kesehatan host, dengan meningkatkan keseimbangan mikroflora intestinal. Probiotik yang sering digunakan adalah golongan BAL khususnya Lactobacillus dan Bifidobacterium. Dengan terpeliharanya mikrobiota usus dapat menginduksi pertumbuhan sel ileum pada prok<sup>18</sup>al usus yang meningkatkan respon GLP-1 (Glucagonlike peptide-1) terhadap adanya makanan. Obesitas apabila menetap selama periode tertentu dapat menyebabkan terjadinya berbagai gangguan metabolismik seperti meningkatnya kadar glukosa. Selain meningkatkan kesehatan usus, probiotik juga telah banyak dimanfaatkan untuk dapat memelihara biota usus yang dapat memberikan efektifitas yang baik dalam memelihara sensitifitas insulin. Menggunakan desain survey deskriptif dengan sampel responden 20 orang mahasiswa obesitas. Tes kadar glukosa darah dianalisis dengan glukometer sebelum dan sesudah mengkonsumsi probiotik selama 16 hari. Hasil : kadar glukosa darah sebelum mengkonsumsi probiotik sebesar 94.25 mg/dL (10.920) dan nilai rata-rata sesudah mengkonsumsi probiotik sebesar 91.20 mg/dL (SD=11.560). uji T dependen menunjukkan hasil adanya perbedaan kada<sup>10</sup>glukosa darah sebelum dan sesudah mengkonsumsi probiotik dengan nilai p value sebesar 0,019 ( $p < 0,05$ ). Kesimpulan : Terdapat perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah mengkonsumsi probiotik pada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018.

**Kata Kunci :** glukosa darah, obesitas, probiotik.**ABSTRACT**

19

Probiotics are live bacteria that are given as food supplements which have beneficial effects on the health of the host, by increasing the balance of intestinal microflora. Probiotics that are often used are the BAL group, especially Lactobacillus and Bifidobacterium, with the maintenance of intestinal microbiota can induce ileal cell growth in the proximal intestine which increases the GLP response, especially Lactobacillus and Bifidobacterium. -1 (Glucagonlike peptide-1) to the presence of food. Obesity if settled for a certain period can cause various metabolic disorders such as increased glucose levels. In addition to improving intestinal health, probiotics have also been widely used to be able to maintain intestinal biota that can provide good effectiveness in maintaining insulin sensitivity. Using a descriptive survey design with a sample of respondents 20 obese students. Blood glucose level tests were analyzed with a glucometer before and after consuming probiotics for 16 days. Results: blood glucose level before consuming probiotics was 94.25 mg / dL (10,920) and the average value after consuming probiotics was 91.20 mg / dL (SD = 11,560). Dependent T test shows the results of differences in blood glucose levels before and after consuming probiotics with a p value of 0.019 ( $p < 0.05$ ). Conclusion: There are differences in blood glucose levels before and after consuming probiotics in Health Ministry Bengkulu Health Polytechnic students in 2018.

**Keywords :** blood glucose, obesity, probiotics

## A. PENDAHULUAN

<sup>21</sup> World Health Organization pada tahun 2016 lebih dari 1,9 miliar orang dewasa berusia 18 tahun ke atas dengan persentase 39% laki-laki dan 40% perempuan mengalami kelebihan berat badan. Secara keseluruhan sekitar 13% populasi orang dewasa di dunia mengalami obesitas pada tahun 2016. Prevalensi obesitas diseluruh dunia hampir tiga kali lipat antara tahun 1975 dan tahun 2016.

Prevalensi gemuk pada remaja usia 13-15 tahun<sup>20</sup> secara nasional adalah sebesar 16,8% yang terdiri dari 8,3% berat badan lebih 16,25% sangat gemuk (obesitas). Sedangkan prevalensi gemuk pada remaja usia 16-18 tahun secara nasional adalah sebesar 7,3% yang terdiri dari remaja gemuk 5,7% dan remaja obesitas sebesar 1,6%. Saat ini obesitas telah menjadi permasalahan dunia, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendeklarasikannya sebagai epidemi global (Kemenkes RI, 2013).

Indonesia merupakan negara berkembang, seiring berjalananya waktu terjadi perubahan gaya hidup yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut berhubungan dengan peningkatan jumlah penderita obesitas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana prevalensi perempuan meningkat sekitar 6% dan laki-laki 3% (Kemenkes RI, 2013)

Obesitas merupakan kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Penimbunan lemak tubuh tersimpan di jaringan adipose pada tubuh (Kusmiati et al,2015). Obesitas disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah energi masuk dengan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, dan pemeliharaan kesehatan. Jika keadaan ini berlangsung terus menerus dalam jangka waktu cukup lama, maka dampaknya adalah terjadinya obesitas (Kusmiati et al, 2015).

<sup>3</sup> Kegemukan atau Obesitas merupakan faktor predisposisi untuk timbulnya peningkatan kadar gula darah, hal ini dikarenakan beberapa sel yaitu, sel-sel beta pulau langerhans menjadi kurang peka terhadap rangsangan atau akibat

<sup>3</sup> naiknya kadar gula dan kegemukan juga akan menekan jumlah reseptor insulin pada sel-sel seluruh tubuh (Guyton. A.C, 2007).

Minuman probiotik merupakan produk minuman hasil fermentasi bakteri probiotik dari asam laktat (BAL) yang memiliki aroma dan rasa khas serta memiliki khasiat untuk mencegah penyakit infeksi saluran pencernaan karena mengandung bakteri hidup yang mampu bertahan dalam saluran pencernaan. Aroma dan rasa khas minuman fermentasi laktat terutama disebabkan oleh perombakan karbohidrat oleh BAL menjadi asam-asam organik dan asetaldehid, sedangkan kemampuannya dalam mencegah penyakit infeksi saluran pencernaan disebabkan oleh kemampuannya memproduksi senyawa-senyawa antimikroba selama fermentasi (Rizal, Marniza, & Nurainy, 2015). Prinsip kerja probiotik yaitu dengan memanfaatkan kemampuan organisme tersebut dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki oleh mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki oleh mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia. Manfaat bakteri probiotik bagi kesehatan manusia diantaranya adalah meningkatkan sistem imunitas, membantu absorpsi nutrisi, memperpendek durasi sakit diare dan membantu pencernaan laktosa (Widiyaningsih, 2011).

## B. METODE PENELITIAN

Jenis rancangan penelitian akan dilakukan menggunakan desain survei deskriptif. Penelitian ini melihat gambaran kadar glukosa darah pada mahasiswa obesitas sebelum dan sesudah mengkonsumsi minuman probiotik di Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018. Penelitian ini

populasinya adalah mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018 yang berjumlah 1921 orang.

Sampel dari populasi tersebut terdapat 20 orang mahasiswa yang termasuk dalam kategori remaja obesitas ( $>27\text{kg}/\text{m}^2$ ). Sehingga dapat digunakan teknik pengambilan sampel dengan cara total sampling. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan cara melakukan Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah pada Mahasiswa Obesitas Poltekkes Kemenkes Bengkulu kemudian mahasiswa di beri minuman Probiotik dan di periksa kembali Kadar Glukosa Darah setelah 2 jam. Waktu penelitian dimulai dari bulan September 2017 sampai bulan April 2018.

### C. HASIL

Analisis univariat merupakan analisis yang dilakukan dengan statistik deskriptif yang digunakan untuk mengambarkan mean dan standar deviasi kadar glukosa darah sebelum dan sesudah mengkonsumsi probiotik.

**Tabel 1. Distribusi frekuensi hasil pemeriksaan kadar rglukosa darah**

Variabel	N	Mean±SD
Glukosa sebelum	20	94,25±10,92
Glukosa sesudah	20	91,20±11,56

Dari tabel 1 tersebut didapatkan hasil rata rata kadar glukosa darah sebelum mengkonsumsi probiotik adalah  $94,25 \text{ mg/dL}$  dan standar deviasi 10,92, sedangkan nilai rata-rata kadar glukosa darah sesudah mengkonsumsi probiotik adalah  $91,20 \text{ mg/dL}$  dan standar deviasi 11,56. Dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan rata-rata kadar glukosa darah sebelum dan sesudah mengkonsumsi probiotik.

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah mengkonsumsi probiotik

pengolahan data menggunakan uji T dependen (Paired Sampel T Test).

**Tabel 2. Perbedaan hasil pemeriksaan kadar glukosa darah**

Variable	N	Mean ± SD	P(IK95%)
Kadar glukosa darah sebelum mengkonsumsi probiotik	20	$94,25 \pm 10,9$	0,019 (0,56-5,53)
Kadar glukosa darah sesudah mengkonsumsi probiotik	20	$91,20 \pm 11,5$	6

Berdasarkan dari tabel 2 tersebut setelah dilakukan uji-T Paired Test untuk melihat apakah ada perbedaan antara kedua pemeriksaan, diperoleh nilai  $p$  value sebesar 0,019 dengan Interval Kepercayaan 95% 0,56-5,53 dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah mengkonsumsi probiotik karena nilai  $p$  value  $<0,05$ .

### D. PEMBAHASAN

Berdasarkan perhitungan statistic didapatkan perbedaan yang signifikan yaitu kadar glukosa darah sebelum mengkonsumsi probiotik lebih tinggi dari pada kadar glukosa darah sesudah mengkonsumsi probiotik. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusmiati (2015), Khrisna (2011), Yamano (2006), Prakash (2017) mengatakan bahwa probiotik dapat menurunkan kadar glukosa darah.

Faktor yang mempengaruhi turunnya kadar glukosa darah yaitu : (1) bakteri yang terkandung didalam minuman probiotik mengandung bakteri asam laktat (*Lactobacillus casei shirota*) yang dapat memelihara biota usus yang dapat memberikan efektifitas yang baik dalam memelihara sensitifitas insulin, dengan cara menghambat aktifitas jalur inflamasi baik dari adanya pathogen,

lipopolisakarida atau asam lemak bebas (2) serta dapat pula disebabkan oleh pola makan dan aktifitas olahraga yang teratur.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al* (2017) yang menunjukkan bahwa bakteri probiotik *lactobacillus* dalam yogurt dapat menurunkan kadar glukosa darah sebanyak 26% dan kadar insulin 36% pada tikus yang diinduksi pakan tinggi fruktosa dibandingkan control. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan di brazil pada penderita diabetes mellitus dengan pemberian minuman sinbiotik sebanyak 200 ml yang mengandung *lactobacillus acidophilus*, *bifidobacterium bifidum* menurunkan kadar glukosa darah sebesar 35% selama 30 hari.

Pada pemeriksaan glukosa darah yang mengalami penurunan hal ini dapat disebabkan oleh bakteri yang terkandung didalam minuman probiotik mengandung bakteri asam laktat (*Lactobacillus casei shirota*) yang mampu bertahan dari pengaruh asam lambung, juga mampu bertahan dalam cairan empedu sehingga mampu bertahan hidup hingga usus halus, sehingga penyerapan nutrisi makanan di tubuh tidak terganggu, serta dapat mencegah gangguan pencernaan terutama konstipasi dan diare serta mengaktifkan sel-sel kekebalan tubuh. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Gomes *et al* (2014) bahwa *Lactobacillus* dapat memelihara biota usus yang dapat memberikan efektifitas yang baik dalam memelihara sensitifitas insulin, dengan cara menghambat aktivitas jalur inflamasi baik dari adanya pathogen, lipopolisakarida atau asam lemak bebas Selain disebabkan oleh mengkonsumsi minuman probiotik, dapat pula disebabkan oleh pola makan dan aktifitas olahraga yang teratur, walaupun ada beberapa responden dengan pola makan serta aktifitas olahraga tidak teratur tetapi mengalami penurunan kadar glukosa hal ini (13) dapat disebabkan karena metabolisme glukosa didalam tubuhnya masih berfungsi baik. Juga dapat pula dipengaruhi oleh penyimpanan minuman probiotik disimpan dilemari pendingin, minuman probiotik ini harus disimpan pada suhu 10°C. Penyimpanan yang tepat akan membantu mempertahankan kualitas minuman probiotik tetap efektif.

## E. KESIMPULAN

24

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2018 yang memiliki indeks masa tubuh obesitas berjumlah 20 orang. Dengan Nilai rata-rata kadar glukosa darah sebelum mengkonsumsi probiotik yaitu 94.25 mg/dL dan Nilai rata-rata kadar glukosa darah sesudah mengkonsumsi probiotik yaitu 91.20mg/dL. Terdapat perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah mengkonsumsi probiotik pada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gomes, A. C., Bueno, A. A., Graziany, R., Souza, M. De, & Mota, J. F. (2014). Gut microbiota , probiotics and diabetes. *Kemenkes RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar 2013. Ministry of Health Republic of Indonesia,* (1), 1–303. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Khrisna, R., Sudjatno, H. R. M., Firmansah, A., Kependidikan, D., Sakit, R., Cicendo, M., & Farmakologi, D. (2011). Perbandingan Pemberian Susu Kedelai Bubuk dan Susu Kedelai Rumah Tangga terhadap Glukosa Darah Puasa pada Tikus Diabetes Melitus Hasil Induksi Aloksan Monohidrat The Comparison of Powdered Soymilk and Domestic Soymilk Administration on Fasting Blood Glucose Level on Induced Diabetic Melitus Rats Aloxan Monohydrate, 43(2), 98–104.
- Kusmiati, M., Herdiansyah, K. D., & Nuraeni, S. (2015). Gambaran Kadar Glukosa dan Kolesterol Total pada Penderita Obesitas Sebelum dan Sesudah Mengkonsumsi Minuman Probiotik. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada*, 14(1), 48–51.
- Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan.
- Prakash, M. S., Rao, P. A., Chathyushya, K.

- B., Haricharan, G., Madhavi, G., Malata, G., Tejaswi, P. S. (2017). Effect of Probiotic supplementation on the fasting blood glucose and immune status in Type II diabetes mellitus . *Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)*, (4), 1244–1248.
- Rahmawati, F. C., Djamiatun, K., & Suci, N. (2017). Pengaruh yogurt sinbiotik pisang terhadap kadar glukosa dan insulin tikus sindrom metabolik, 14(1), 10–18.
- Rizal, S., Marniza, & Nurainy, F. (2015). Pemanfaatan Kulit Nanas Pada Pembuatan Minuman Probiotik Dengan Strain Bakteri Asam Laktat Berbeda. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Universitas Lampung*, 26(November), 459–473.
- Widiyaningsih, E. N. (2011). Peran Probiotik Untuk Kesehatan. *Jurnal Kesehatan*, 4(1), 14–20.
- Yamano, T., Tanida, M., Niijima, A., & Maeda, K. (2006). Effects of the probiotic strain Lactobacillus johnsonii strain La1 on autonomic nerves and blood glucose in rats, 79, 1963–1967.

<https://doi.org/10.1016/j.lfs.2006.06.03>

8

# ANALISIS KADAR GLUKOSA DARAH PADA MAHASISWA OBESITAS SEBELUM DAN SESUDAH MENGONSUMSI PROBIOTIK DI POLTEKKES KEMENKES BENGKULU

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	<a href="#">biologikelbiotek.wordpress.com</a>	1 %
2	<a href="#">journals.usm.ac.id</a>	1 %
3	<a href="#">jurnahnasional.ump.ac.id</a>	1 %
4	<a href="#">crosformation.wordpress.com</a>	1 %
5	<a href="#">repository.lppm.unila.ac.id</a>	1 %
6	<a href="#">repository.unissula.ac.id</a>	1 %
7	<a href="#">www.umj.com.ua</a>	1 %
8	<a href="#">mafiadoc.com</a>	1 %

- 9 Muhammad Yusmansyah Lubis, Dassy Hermawan, Upik Febriani, Achmad Farich. "HUBUNGAN ANTARA FAKTOR KETURUNAN, JENIS KELAMIN DAN TINGKAT SOSIAL EKONOMI ORANG TUA DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA MAHASISWA DI UNIVERSITAS MALAHAYATI TAHUN 2020", Human Care Journal, 2020  
Publication
- 
- 10 Roza Linda, Indah Lestari, Sri Wahyuni Gayatri, Aryanti Bamahry, Rasfayanah F. Matto. "Pengaruh Ekstrak Daun Salam (*Eugenia polyantha*) terhadap Kadar Glukosa Darah pada Mencit (*Mus Musculus*)", UMI Medical Journal, 2020  
Publication
- 
- 11 [www.semanticscholar.org](http://www.semanticscholar.org) 1 %  
Internet Source
- 
- 12 [jurnal.uimedan.ac.id](http://jurnal.uimedan.ac.id) 1 %  
Internet Source
- 
- 13 [ojs.uajy.ac.id](http://ojs.uajy.ac.id) 1 %  
Internet Source
- 
- 14 [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) 1 %  
Internet Source
- 
- 15 [tailieu.vn](http://tailieu.vn) 1 %  
Internet Source

- 16 Asmarani . , Andi Uznul Alriansyah, Juriadi Paddo, Nina Indriyani N. "Analisis Aktivitas Fisik dan Konsumsi Makanan Cepat Saji sebagai Faktor Risiko Terhadap Obesitas pada Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Kendari", Health Information : Jurnal Penelitian, 2019  
Publication 1 %
- 17 R D Andriani, P P Rahayu, M W Apriliyani. "Antihyperglycemic Activities of Fermented Milk Enriched with Gembili ", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020  
Publication 1 %
- 18 publikasi.polje.ac.id 1 %  
Internet Source
- 19 repository.medri.uniri.hr <1 %  
Internet Source
- 20 pt.scribd.com <1 %  
Internet Source
- 21 repositori.usu.ac.id <1 %  
Internet Source
- 22 www.scielo.br <1 %  
Internet Source
- 23 eprints.ums.ac.id <1 %  
Internet Source
- 24 journal.unnes.ac.id <1 %  
Internet Source

25	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.atmos-chem-phys.net Internet Source	<1 %
27	Martina Mogan, Endang Trisnawati. "Giving Cinnamommum Verum To Pain And Healing Of Perineum Stitch Wounds In Puerperal Mother", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2022 Publication	<1 %
28	jurnal.unej.ac.id Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes      Off  
Exclude bibliography    On

Exclude matches      Off