

DAFTAR PUSTAKA

- Abi. (2017). *“Association of plasminuria with overhydration in patients with CKD”*.
- Brunner & Suddarth. (2017). *“Asuhan keperawatan klien gangguan ginjal.Jakarta:EGC.”*
- Basuki. (2019). *“Mekanisme koping dengan tingkat depresi pada pasien gagal ginjal.”*
- Budiono. (2019). *“Pengaruh Pemberian Contrast Bath Dengan Elevasi Kaki 30° Terhadap Penurunan Derajat Edema Pada Pasien Gagal Jantung Kongestif.”*
- Chalik.(2017). *“Pengaruh metode pendidikan kesehatan individual terhadap kepatuhan dalam pembatasan asupan cairan pada pasien CKD.Jakarta.”*
- Dinarti & Mulyanti. (2017).” *Kombinasi ankle pump exercise terhadap penurunan edema kaki pada pasien CKD.”*
- F. G. Becker. (2017). *“SOP Pemberian Posisi Meninggikan Kaki 30° Pada Klien Post Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah.”*
- F. A. Y Sagiran. (2018). *“Penggunaan Leg Elevator Terhadap Circumference Edema Kenyamanan dan Fungsi Pada Ulkus Kaki, J. Kesehatan Karya Husada, vol. 6, no. 2, hal. 102-119.”*
- Hanggraini dkk. (2020). *“Upaya penurunan volume cairan pada pasien CKD.”*
- Hamzah dkk. (2021).” *Efektifitas latihan kaki terhadap diameter edema.”*
- Hidayat. (2019). *“Faktor-faktor resiko kejadian pasien CKD.”*
- H. Gul, A. Fatima, A. Ahmad, dan S. A. Gilani. (2021). *“Effect Of Ankle Pump Exercises On Limb Edema In Critically ill Patient With Acute Respiratory Distress Syndrome, ther (Journal Ther. Rehabil. Sci., vol. 2, no. 2, hal. 15-18.”*
- Jainuurakhma dkk. (2021). *“Association of smoking with incident CKD risk in the general population.”*
- LeMone et.al. (2019). *“US renal data system 2020 annual data report: epidemiology of kidney disease in the united states.”*

- Maulina. (2018). "Upaya penurunan volume cairan pada pasien CKD."
- Mayo. (2019). "*Ankle pumping exercise and lag elevation in 30 ° has the same level of effectiveness to reducing foot edema et chronuc renal.*"
- Monika. (2019). "Pengaruh penggunaan erless (edema reduction) leg elevator stainless steel)."
- Muhrozi. (2020). "Pemberian Posisi Meninggikan Kaki 30° Pada Klien Post Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah."
- Nurbadriyah. (2021). "Karakteristik faktor resiko pasien CKD yang menjalani hemodialisa."
- Pebrianti. (2018). "Tingkat depresi dengan kualitas hidup pasien *Chronic Kidney Disease* (CKD)."
- P. Prastika. (2019). "*Ankle pumping exercise and lag elevation in 30 ° has the same level of effectiveness to reducing foot edema et chronic kidney disease.*"
- Riskesdas. (2013). "Pelaksanaan Pengumpulan Data Riset Kesehatan Dasar."
- R. Melianna. (2019). "efektifitas latihan kaki terhadap diameter edema."
- Roshdahl. (2017). "*CKD epidemiology and risk factors.*"
- Sukmana. (2017). "Penggunaan Erless 30° dan 45° Terhadap Circumference Edema,Kenyamana Dan Fungsi Pada Ulkus Kaki Diabetes Di Rumah Sakit Samarinda."
- Suparmo. (2021). "Hubungan Kepatuhan Pembatasan Cairan Terhadap Terjadinya Edema post Hemodialisa Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Di Rumah Sakit Aminah Kota Tangerang."
- S. N. Kholilah. (2022). "Pengaruh *Ankle Pump Exercise* Terhadap Penurunan Edema."
- Sutanta. (2021). "pengaruh penggunaan erless (edema reduction leg elevator stainless steel)."
- Susetyowati dkk. (2019). "Penggunaan erless 30° dan 45° terhadap circumference edema, kenyamanan dan fungsi pada ulkus kaki diabetes."
- Suwitra, dkk. (2017). "*Cardiogenic pulmonary edema and acute respiratory*

distress syndrome.”

S. Wati dan I. Erman. (2019). “Faktor Resiko Kualitas Hidup Klien *Chronic Kidney Disease*.”

SDKI, “Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Jakarta:EGC.”

SLKI, “Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jakarta: EGC.”

SIKI, “Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta: EGC.”

Toya et al. (2017). “*Ankle positioon and exercise intervals effect on the blood flow velocity in the common femoral vein during ankle pumping exercise.*”

Wilson. (2018). “Hubungan lama menjalani hemodialisis dengan kualitas hidup pasien penyakit gagal ginjal kronik.”

Wulandari. (2022). “Hubungan pengetahuan dengan kepatuhan pasien CKD menjalani hemodialisa.”

Zuliani dkk. (2021). “*Enhanced muscle blood flow with intermittent pneumatic compression of the lower leg during plantar flexion exercise and recovery.*”