BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa kejadian *Drug Related Problems* (DRPs) terkait interaksi obat golongan antidepresan pada pasien skizofrenia didapatkan 100% mengalami interaksi. Interaksi secara farmakodinamik sebanyak 167 (66,27%) dan farmakokinetik sebanyak 85 (33,73%). Tingkat keparahan atau level interaksi tertinggi yang banyak terjadi yaitu *Monitor Closely* atau *Moderate* sebanyak 183 (72,62%) dan *Serious-Use Alternative* atau *Mayor* sebanyak 57 (22,62%) dengan kejadian interaksi antara obat fluoxetine dan risperidone. Pada level interaksi *Minor* sebanyak 12 (4,76%) dengan kejadian interaksi antara obat amitriptyline dan chlorpromazine.

B. Saran

1. Bagi rumah sakit

Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait interaksi untuk pasien dengan diagnosa skizofrenia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian lebih mendalam untuk meningkatkan pemahaman terkait *Drug Related Problems* (DRPs).

Kemenkes Poltekkes Bengkulu